



Leitfaden für die sichere Anwendung – Patienten und Patientinnen

Baqsimi (Glucagon)

Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage) zu Baqsimi aufmerksam durch


Dieses Schulungsmaterial wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass Patienten und Angehörige/Pflegende/Betreuungspersonen die besonderen Sicherheitsanforderungen von Baqsimi (Glucagon) Nasenpulver 3 mg in einem Einzeldosisbehältnis zur Behandlung von schwerer Hypoglykämie bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr mit Diabetes mellitus kennen und berücksichtigen. Auf diese Weise soll das Risiko einer unsachgemäßen Anwendung des Einzeldosisbehältnisses minimiert werden, sodass es nicht zu einem Ausbleiben der Arzneimittelwirkung kommt.

ANWENDUNGSHINWEIS ZUR SICHEREN ANWENDUNG - PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Bewahren Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten gelben Röhrchen auf und ziehen Sie auch NICHT die Folie ab. Dadurch bleibt BAQSIMI vor Feuchtigkeit geschützt. Wenn das Arzneimittel feucht wird, kann es sein, dass es weniger oder gar nicht wirksam ist. Das Entfernen der Folie und das Öffnen des gelben Röhrchens darf erst unmittelbar vor der Anwendung erfolgen.



Zur nasalen Anwendung nur zum einmaligen Gebrauch



- Halten Sie das Einzeldosisbehältnis zwischen den Fingern.
- BAQSIMI enthält nur eine Dosis Glukagon. Deshalb zunächst NICHT den Kolben (A) drücken und NICHT das Einzeldosisbehältnis testen.



- Schieben Sie die Spitze des Behältnisses (B) behutsam in ein Nasenloch, bis ein Finger die Außenseite der Nase berührt.



- Drücken Sie jetzt den Kolben (A) vollständig durch.
- Die Dosis wurde vollständig verabreicht, wenn der grüne Streifen am Kolben nicht mehr sichtbar ist.

Nach Verabreichen der Dosis:

- Falls die Person bewusstlos ist, bringen Sie diese nach der Gabe von BAQSIMI in die stabile Seitenlage.
- Fordern Sie umgehend medizinische Hilfe an.
- Wenn die betroffene Person bei Bewusstsein ist, halten Sie diese dazu an, so schnell wie möglich einen Imbiss oder ein Getränk mit hohem Zuckergehalt zu sich zu nehmen, wie z. B. Traubenzucker oder Fruchtsaft.
- Entsorgen Sie das verwendete Einzeldosisbehältnis und das gelbe Röhrchen.

WEITERE HINWEISE

- Zeigen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo Sie BAQSIMI aufbewahren und erklären Sie ihnen anhand dieser Anweisungen, wie es anzuwenden ist. Diese müssen wissen, wie es anzuwenden ist, bevor Sie es benötigen. Bitte nutzen Sie hierzu auch das im Internet verfügbare BAQSIMI-Schulungsvideo, Link und QR-Code sind unten angegeben.
- BAQSIMI enthält nur eine Dosis Glukagon – entlüften Sie das Einzeldosisbehältnis daher NICHT und drücken Sie daher NICHT den Kolben, bevor Sie die Spitze des Behältnisses in das Nasenloch eingeführt haben.
- Für detaillierte Informationen in Bezug auf die Anwendung und die Handhabung von BAQSIMI lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation und Bedienungsanleitung.



Alle Schulungsmaterialien für Patienten zu Glucagon (Anwendungshinweis und Schulungsvideo) sowie die Gebrauchsinformation sind auch online durch Scannen des QR-Codes oder über <https://www.baqsimi.eu/> verfügbar. Gedruckte Exemplare können Sie beim pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten) bestellen.

MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN

Die Meldung von Nebenwirkungen ist von großer Wichtigkeit für eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen- Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln. Bitte melden Sie Nebenwirkungen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, <http://www.bfarm.de/> oder dem pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten).

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Amphastar France Pharmaceuticals | Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte | Frankreich | Tel.: 0800 1808473 | email: gps@amphastar.com

© 2025 Amphastar

